

	Date limite de semis	Semis sous couvert	Dose de semis en pur (en kg/ha)	Pousse si climat :			Pâturage			Ensilage		Affouragement en vert		Impact agronomique	Sensibilité au froid	Valeur fourragère	Critère choix variétés	Remarques particulières
				Froid et sec	Froid et humide	Chaud et sec	Automne	Hiver	Printemps	Automne	Printemps	Automne	Printemps					
Chou moellier	1 <sup>er</sup> septembre	Non	6	+	++	+	Oui	Oui	Non	Délicat (jus)	Non	Oui	Non	Piège N	-6°	1UF 93PDI	-	Pâturage rationné
Chou 1/2moellier	1 <sup>er</sup> septembre	Non	6	+	++	+	Oui	Oui	Non	Délicat (jus)	Non	Oui	Non	Piège N	-10°	1UF 93PDI	-	Pâturage rationné
Chou cavalier	1 <sup>er</sup> septembre	Non	6	+	++	+	Oui	Oui	Non	Délicat (jus)	Non	Oui	Non	Piège N	-12°	1UF 93PDI	-	Pâturage rationné
Colza fourrager	1 <sup>er</sup> septembre	Non	10	+	++	+	Oui	Oui	Non	Délicat (jus)	Non	Oui	Non	CIPAN	Résiste	0,93UF 113PDI	Alternatif ou non	Pâturage rationné
Radis fourrager	10 septembre	Non	10	+	++	+++	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	CIPAN	-6°	0,9UF 100PDI		Remontante alternative
Navet fourrager	10 septembre	Non	20	+	++	+++	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	CIPAN	-6°	0,9UF 90PDI		
Navette fourragère	10 septembre	Non	10	++	+++	++	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	CIPAN	-5°	0,93UF 113PDI	Alternativité	Non remontant
RGI diploïde alternatif	1 <sup>er</sup> septembre	Oui	20	-	+	+	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	CIPAN	Résiste	0,85UF 80PDI	Verse maladie	Remontaison
RGI diploïde Non alternatif	1 <sup>er</sup> septembre	Oui	20	-	+	+	Oui	Non	Oui	Non Pas d'épi	Oui	Oui	Oui	CIPAN	Résiste	0,90UF 90PDI		
RGI tétraploïde Alternatif	1 <sup>er</sup> septembre	Oui	25	-	+	+	Oui	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	CIPAN	Résiste	0,85UF 80PDI		
RGI tétraploïde Non alternatif	1 <sup>er</sup> septembre	Oui	25	-	+	+	Oui	Non	Oui	Non Pas d'épi	Oui	Oui	Oui	CIPAN	Résiste	0,90UF 90PDI		
RGH	1 <sup>er</sup> septembre	Oui	20/25 Di/tétra	-	+	+	Oui	Non	Oui	Oui Si épié	Oui	Oui	Oui	CIPAN	Résiste	0,90UF 90PDI	Type anglais ou italien	
Avena strigosa	20 août	Non	35	+	+	++	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	+ sur Structure	Très sensible	0,80UF 75PDI	-	Pas de maladie
Avoine de printemps	20 août	Non	100	++	++	+	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	+ sur Structure	Sensible	0,80UF 75PDI		Sensible aux rouilles
Avoine d'hiver	1 <sup>er</sup> septembre	Non	100	++	+	+	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	+ sur Structure	Résiste	0,75UF 70PDI		
Seigle	20 août	Non	60/100	++	+	++	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui	+ sur structure	Résiste	0,75UF 70PDI		
Trèfle d'Alexandrie	15 août	Oui	20	++	++	++	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Non	Structure et reliquat N	Très sensible	0,85UF 110PDI	-	Alternatif remontant
Trèfle incarnat	15 août	Oui	20	++	++	++	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Structure et reliquat N	Résiste	0,80UF 110PDI	Résistance verse et maladies	Alternatif Non remontant
Vesce	1 <sup>er</sup> septembre	Non	60	+	++	+++	Oui, si associée	Non	Non	Oui, si associée	Oui selon variétés	Oui si associée	Oui, selon variété	Reliquat N	Selon variétés	0,90UF 110PDI	Hiver/pts	Non remontant
Pois fourrager	15 août	Non	160	++	++	+++	Oui, si associé	Non	Non	Oui, si associé		Si associé	Si associé	Reliquat N	Selon variétés	1UF 120PDI	Hiver / pts	Exiger variété Fo.
Moha triticale	1 <sup>er</sup> août	Non	25	-	-	+++	Oui	Non	Non	Oui		Oui	Non		Très sensible	0,70UF 60PDI	-	Espèce de sec et chaud